



Programma svezzamento VITELLE DA RIMONTA

150 gr/L

MADE IN ITALY

PRODOTTO	PERIODO									
	0/3 gg	3/7 gg	2 ^a sett	3 ^a sett	4 ^a sett	5 ^a sett	6 ^a sett	7 ^a sett	8 ^a sett	9 ^a sett
Colostro materno	2/3 L/pasto per minimo 3 volte									
Colobooster	60 gr/L da aggiungere al colostro									
Ferro destrano	5 ml intramuscolo unica iniezione									
Healthy Frabes	5 gr/L per un trattamento preventivo (15 gr/L per 2/3 giorni per un trattamento intensivo)									
Sostitutivo del latte Frabes	2 L/pasto (2 pasti)	2,5 L/pasto (2 pasti)	3 L/pasto (2 pasti)	3,5 L/pasto (2 pasti)	3,5 L/pasto (2 pasti)	3 L/pasto (2 pasti)	3 L/pasto (2 pasti)	2 L/pasto (2 pasti)	2 L/pasto (2 pasti)	2 L/pasto (1 pasto)
Mangime da svezzamento (starter)	50 gr/giorno	100 gr/giorno	200 gr/giorno	400 gr/giorno	600 gr/giorno	800 gr/giorno	1000 gr/giorno	1200 gr/giorno	1400 gr/giorno	
Idra Frabes	In caso di necessità 25 gr/L di acqua (secondo le specifiche)									

CONSIGLI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE DEL SOSTITUTIVO DEL LATTE

TEMPERATURA




da 45/50°C

TEMPO DI MISCELAZIONE



2 minuti
con strumentazione idonea

Acqua	Frabes MR	Latte ricostituito	Acqua	Frabes MR	Latte ricostituito	Acqua	Frabes MR	Latte ricostituito
0,85	0,15	1	25	4,41	29,4	50	8,82	58,8
5	0,88	5,9	30	5,29	35,3	55	9,71	64,7
10	1,76	11,8	35	6,18	41,2	60	10,59	70,6
15	2,65	17,6	40	7,06	47,1	65	11,47	76,5
20	3,53	23,5	45	7,94	52,9	70	12,35	82,4





COLOBOOSTER

Mangime complementare che contiene concentrato proteico del siero di latte (WPC) e olio di cocco che apportano proteine, grassi e quindi energia, per supportare e sviluppare correttamente il sistema immunitario. Può essere utilizzato sia con colostro di scarsa o media qualità per aumentarne le qualità delle componenti nutrizionali, sia con colostro già di buona qualità per dare un ulteriore sostegno all'animale.

60
gr/L di colostro



HEALTHY FRABES

Mangime complementare che contiene semi di lino e Progut Rumen®, una materia prima a base di lievito idrolizzato, prodotta da lievito di birra (*Saccharomyces cerevisiae*) mediante un processo brevettato ed è ricca di mannoproteine, β -glucani e nucleotidi. Progut Rumen® viene utilizzato per supportare la salute del tratto digerente, difendendo la parete intestinale da agenti patogeni e stimolando il sistema immunitario. Healthy Frabes favorisce l'assorbimento dei liquidi intestinali e contribuisce a rendere più dense le feci.

Standard:
5 gr/L
dal 3° al 14° giorno
Intensivo:
15 gr/L
di MR o acqua tiepida (35°C)



SOSTITUTIVI DEL LATTE FRABES

Linea completa di sostituti del latte per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di allevatore nonché i fabbisogni nutrizionali del vitello, assicurando il corretto sviluppo e funzionamento gastrointestinale dei giovani animali. Per la produzione dei sostituti del latte Frabes prestiamo particolare attenzione alla qualità delle materie prime mediante loro attenta selezione e acquisto. Tutti i prodotti Frabes sono formulati e testati per rispettare standard di elevata qualità e garantirne alta solubilità ed elevata scorrevolezza, ideali per le allattatrici automatiche, miscelatori e la preparazione manuale nel secchio.

150
gr/L



IDRA FRABES

Mangime complementare di ottima appetibilità formulato con destrosio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, bicarbonato di sodio e pectine. Idra Frabes aiuta l'assorbimento dei liquidi dall'intestino e favorisce un corretto equilibrio acido-basico. Ideale in seguito a situazioni di disidratazione, stress da caldo, sovraffollamenti, ristalli, terapie e stati di acidosi metabolica.

25 gr/L
di acqua tiepida (35°C)
Standard: 1 volta al giorno
Intensivo: più volte al giorno

CONSIGLI



IGIENE

- Verificare abitualmente la **pulizia** di strutture, miscelatori e di tutte le strumentazioni che vengono utilizzate per la preparazione del sostituto del latte.



ACQUA

- Mettere a disposizione acqua **tiepida** e **pulita** due o tre ore dopo il pasto.
- In caso di alte temperature somministrare un terzo pasto con acqua tiepida e Idra Frabes.



TEMPERATURA

- Utilizzare acqua a temperatura superiore a **70°C** per la preparazione può **danneggiare** il sostituto del latte.
- Somministrare il sostituto del latte ad una temperatura di **40°C**.



MANGIME

- Mettere a disposizione **mangime e fibra fin dal terzo o quarto** giorno di vita.
- Svezzare solo quando l'assunzione di mangime è **almeno di 1,4 kg** al giorno per vitello.



STOCCAGGIO

- Conservare il sostituto del latte in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.
- Richiudere accuratamente il sacco una volta aperto.

Per maggiori informazioni, supporto tecnico o un programma di alimentazione personalizzato potete contattare il tecnico Frabes di riferimento.